

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП 001838 - 140912

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сустилак

Торговое название препарата: Сустилак

Международное непатентованное название: глюкозамин

Лекарственная форма: таблетки модифицированного высвобождения, покрытые пленочной оболочкой

Состав

1 таблетка содержит:

Активное вещество: глюкозамина гидрохлорид - 1500 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат - 62 мг, гипромеллоза (К200М) - 40 мг, повидон К90 - 40 мг, целлюлоза микрокристаллическая& - 83 мг, гипромеллоза (К100М) - 80 мг, кремния диоксид коллоидный - 5 мг, стеариновая кислота - 40 мг

Состав оболочки: гипромеллоза Е-5 - 20 мг, макрогол-6000 - 6 мг, опадрай белый (титана диоксид, макрогол, гипромеллоза) - 11 мг.

Описание

Овальные таблетки белого или почти белого цвета, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор.

Код ATX: M01AX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Глюкозамин способствует предотвращению процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости. Улучшает подвижность суставов, уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП).

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте; пролонгированная форма обеспечивает непрерывное высвобождение активного вещества и его равномерную абсорбцию; биодоступность глюкозамина после приема внутрь составляет 25- 26% (эффект "первичного прохождения" через печень). После распределения в тканях наибольшие концентрации наблюдаются в печени, почках и хрящевой ткани. Метаболизируется до воды, углекислого газа и мочевины. Выводится в основном почками.

Показания к применению

Остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глюкозамину и другим компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью:

бронхиальная астма, сахарный диабет, непереносимость морепродуктов (креветки, моллюски).

Способ применения и дозы

Внутрь. Принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки, таблетки проглатывают целиком, запивая водой, в течение 6-12 недель.

По рекомендации врача курс лечения повторяют с интервалом в 2 месяца. Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата в течение 6 месяцев.

Побочное действие

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны: нарушения функции желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастрии, метеоризм, запор или диарея, тошнота; кожные аллергические реакции (крапивница, кожный зуд).

Передозировка

Симптомы: случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола. Препарат совместим с парацетамолом, НПВП и глюкокортикоидами. При совместном применении с НПВП усиливает противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

Особые указания

Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

Нет ограничений относительно управление автотранспортом и сложными механизмами в период применения препарата.

Форма выпуска

Таблетки модифицированного высвобождения, покрытые пленочной оболочкой 1500 мг. По 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 4 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25⁰C .

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «РЕМЕДИЯ»

121069, г. Москва, Столовый пер., д. 6, стр. 2

тел. (495) 916-63-26, факс (495) 916-62-75

Производитель

«Медрик Лимитед», Индия.

Адрес представительства/организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «РЕМЕДИЯ» 121069, г. Москва, Столовый пер., д. 6, стр. 2

тел. (495) 916-63-26, факс (495) 916-62-75

Генеральный директор
ООО «Феу-Дагаз Компани»



Д.В. Сырямин